

SELEKT lahused manustatakse vatsa SELEKT pumponsdi abil.

1. Kerge veetustumise korral lahustada üks pakk SELEKT Fresh Cow 500, SELEKT Off Feed või SELEKT Restore pulbrit 20 liitris soojas vees.
2. Keskmise veetustumise korral manustada lisaks punktis 1 toodud juhistele veel üks pakk SELEKT Restoret lahustatult 20 liitris soojas vees.
3. Tõsise veetustumise korral manustada lisaks punktis 1 toodud juhistele veel kaks pakki SELEKT Restoret lahustatuna 40 liitris soojas vees. Ühel manustamise korral võib kasutada maksimaalselt 1 paki SELEKT Off Feed või SELEKT Fresh Cow 500 pulbrit. Ärge kunagi kasutage SELEKT Off Feed ja SELEKT Fresh Cow 500 pulbrit koos.
4. Täiskasvanud veise ägeda vatsa atsidoosi korral lahustada üks pakk SELEKT Antacid pulbrit 20 liitris soojas vees. Noorloomade puhul vähendada valmislahuse kogust.
5. SELEKT Glycerol Plus täiendsööta tuleks loomale manustada lahustatuna vähemalt samas koguses soojas vees (1:1) ning soovitatavalt isegi 1:10 või enam. SELEKT Glycerol Plus ei sisalda lahustunud aineid, seetõttu pole koos teise SELEKT lahusega manustamise korral vaja kasutada lisavett.

	SELEKT Antacid	SELEKT Charbon Fluide™ vedelik aktiivsõega	SELEKT Fresh Cow 500	SELEKT Glycerol Plus	SELEKT Off Feed	SELEKT Restore
Äge vatsa atsidoos	✓					
Keisrilõike järgne periood			✓	✓		
Kõhulahtisus, mis on põhjustatud mükotoksiinidest või bakternakkustest		✓				✓
Veetustumine või endotokseemiline šokk, mis on põhjustatud mastiitidest, metriidist, traumaatilise retikuliidist, pleuriidist, astsiidist vms						✓
Isutus laktatsiooni alguses					✓	
Ketoosi tekke riski vähendamiseks			✓			
Ketoosist taastumiseks				✓		✓
Pärast libediku vasakule või paremale paigaltnihkumise korrigeerimist				✓	✓	✓
Libediku vasakule või paremale paigaltnihkumise riski vähendamiseks			✓			
Poegimishalvatuse ja hüpokaltseemia tekke riski vähendamiseks			✓			
Tammetõrvade, ristirohu, vesiputke vms tõttu tekkinud mürgistuse korral		✓				