44659

EFICO Alpha 790 | FORELL

Deklaratsioon		3 mm	4,5 mm	6 mm	8 mm
Toorproteiin	%	43-46	39-42	37-40	37-40
Toorrasv	%	26-29	28-31	29-32	29-32
Süsivesikud	%	11,6-17,6	13,3-19,3	13,8-19,8	13,8-19,8
Kiud	%	0,9-2,7	1,2-3,2	1,3-3,3	1,3-3,3
Tuhk	%	5,1-7,1	4,8-6,8	4,4-6,4	4,4-6,4
Kogufosfor (P)	%	0,9	0,9	0,9	0,9
Koguenergia	MJ/kg	23,4-25,4	23,7-25,7	23,8-25,8	23,8-25,8
BioMari seeduv energia*	MJ/kg	20,6	20,8	20,9	20,9
Klassikaline seeduv energia**	MJ/kg	21,3	21,5	21,7	21,7
Tüüpiline lämmastikusisaldus (N)	%	7,1	6,5	6,2	6,2
Graanulite arv kg-s - indikatiivne***		48700	14800	6050	2600

*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
***Numbrid sõltuvad ± 10% partiidest ja põhinevad olemasolevatel numbritel

Keskkonnamõju näidikud

Andmed põhinevad 24 kuu jooksval keskmisel toorainekulul.



Loe lisa: www.biomar.com/en/global/sustainability/impact-parameters

Reostuskoormuse näitajad

Graafiku info kehtib 4,5 mm kohta.



Tootelehel deklareeritud väärtused võivad erineda sõltuvalt tootmistehasest ja toorainete looduslikust erinevusest. Rohkem informatsiooni, täpsed väärtused ja koostisosad on leitavad toote etiketil. Etiketi leiate vastavalt EL nõuetele tootelt.

Koostis põhineb BioMar'i tulemuslikkuse kontseptsioonil. Rohkema informatsiooni saamiseks toodete kohta külastage meie kodulehekülge või küsige kliendihaldurilt.

Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)

Kala suurus grammid	Graanuli läbimõõt mm	Temperatuur 4 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C
50 - 60	3,0	0,49	0,73	0,97	1,19	1,37	1,50	1,52	1,43	1,16
60 - 80	3,0	0,48	0,72	0,95	1,17	1,35	1,47	1,50	1,41	1,14
80 - 100	3,0	0,47	0,71	0,94	1,15	1,33	1,45	1,48	1,39	1,12
100 - 200	4,5	0,46	0,69	0,91	1,12	1,30	1,41	1,44	1,35	1,09
200 - 300	4,5	0,43	0,64	0,85	1,05	1,21	1,32	1,34	1,26	1,02
300 - 450	4,5	0,40	0,60	0,80	0,98	1,13	1,23	1,25	1,18	0,95
450 - 600	6,0	0,38	0,56	0,75	0,92	1,06	1,16	1,18	1,11	0,90
600 - 800	6,0	0,35	0,52	0,69	0,85	0,98	1,07	1,09	1,02	0,83
800 - 1000	6,0	0,32	0,48	0,64	0,79	0,91	0,99	1,01	0,95	0,77
1000 - 1400	8,0	0,29	0,44	0,58	0,71	0,83	0,90	0,92	0,86	0,70
1400 - 2000	8,0	0,25	0,37	0,49	0,60	0,70	0,76	0,77	0,72	0,59
2000 - 3000	8,0	0,19	0,28	0,38	0,46	0,53	0,58	0,59	0,56	0,45

Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist. Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta. Võimalikud söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.

Sööta on soovitatav hoida kuivas ja jahedas kaitstuna päikesevalguse ja koduloomade eest.
Parim enne kuupäev: vaata pakendilt.

Tootja: BioMar A/S · Mylius-Erichsensvej 35 · 7330 Brande · Taani · Tel: +45 97 18 07 22 · info@biomar.dk · www.biomar.dk
Edasimüüja: AS Dimedium, Roheline 9, Tähtvere · 61410 Tartu · Eesti · Tel: +372 5340 0539